

ПАМЯТКА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ СЛУХОВЫХ ТРУБ



КЛИНИКА
УХА, ГОРЛА
И НОСА

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

ДОРОГОЙ ПАЦИЕНТ!

Поздравляем с назначением исследования функции слуховых труб. Этот метод позволяет оценить вентиляционную способность слуховой трубы, выявить причину заложенности уха и тугоухости. Чтобы результаты были точными, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями.
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.

Исследование безболезненно, длится 10–15 минут. Вас попросят делать глотательные движения или натуживаться.
НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ, ВАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВАЖНО ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА.

• Исследование оценивает, как открывается труба при глотании, зевке, натуживании.
Нормальная труба открывается при каждом глотке.

ЧТО ЭТО ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ

Метод основан на регистрации давления в барабанной полости. При глотании труба открывается, давление выравнивается – это регистрирует прибор.
Исследование помогает диагностировать тубоотит и стеноз слуховой трубы.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ (ПОДГОТОВКА)

• **ОЧИСТИТЕ УШИ.**

За 2–3 дня удалите серу у ЛОР-врача.

Не используйте ватные палочки.

• **СООБЩИТЕ О СИМПТОМАХ.**

Расскажите о заложенности уха, щёлканье при глотании, шуме в ушах.

• **НЕ ЕШЬТЕ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ.**

За 1–2 часа воздержитесь от еды – частые глотки искажают результат.

• **СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ.**

Посидите 10–15 минут в покое. Избегайте стресса и нагрузок.

• **ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ.**

Паспорт, полис, направление.

Предыдущие исследования слуха – для сравнения.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

- Не используйте ватные палочки для чистки ушей.
- Не закапывайте капли в уши в день исследования.
- Не сморкайтесь агрессивно за 2–3 часа до процедуры.
- Не приходите при насморке или остром отите – результат будет недостоверным.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острый средний отит.
- Перфорация барабанной перепонки.
- Выделения из уха.
- Температура выше 37,5°C.
- Сильный насморк.

СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРИЛИ НАМ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ТОЧНЫХ ВАМ РЕЗУЛЬТАТОВ!

КОГДА НУЖНО ПРИЙТИ К ВРАЧУ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

- **ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР:** Придите к ЛОР-врачу с заключением. Врач назначит лечение (продувание, тренировка труб).
- **КОГДА ОБРАТИТЬСЯ СРОЧНО ДО ИССЛЕДОВАНИЯ:**
- Внезапное ухудшение слуха.
- Сильная боль в ухе.

КАК ПРОХОДИТ ИССЛЕДОВАНИЕ

В ухо вставляется мягкий зонд. Вас попросят сделать несколько глотков, затем глоток с зажатым носом (проба Тойнби), затем натуживание с закрытым ртом и носом (проба Вальсальвы).

**С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ**

Наш телефон:
8 (495) 153-40-94
lorlor.ru